構造系を持つ全行列多元環

藤田尚昌 (筑波大学)

1. 定義と研究の経緯

体 F 上の $n \times n$ 行列全体の集合 $\mathbb{M}_n(F)$ は n^2 個の行列単位 $\{e_{ij} \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ を基底とする F -ベクトル空間 $\mathbb{M}_n(F) = \bigoplus_{1 \leq i, j \leq n} F e_{ij}$ になり

$$e_{ik} \cdot e_{lj} = \begin{cases} e_{ij} & \text{if } k = l \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

で積を定めると、通常的全行列多元環になる。この積を n 個の $n \times n$ 行列の組 (= 構造系) $\mathbb{A}$ で退化させて新たな多元環を定義する。即ち

定義 ([9]): n 個の $n \times n$ 行列 $A_k = (a_{ij}^{(k)}) \in \mathbb{M}_n(F)$ ($k = 1, \dots, n$) の組 $\mathbb{A} = (A_1, \dots, A_n)$ が次の3条件を満たすとする。

- (A1) $a_{ij}^{(k)} a_{il}^{(j)} = a_{il}^{(k)} a_{kl}^{(j)}$ for all $1 \leq i, j, k, l \leq n$
- (A2) $a_{ij}^{(i)} = a_{ij}^{(j)} = 1$ for all $1 \leq i, j \leq n$
- (A3) $a_{ii}^{(k)} = 0$ whenever $i \neq k, 1 \leq i, k \leq n$

F -ベクトル空間 $A = \bigoplus_{1 \leq i, j \leq n} F e_{ij}$ に積を

$$e_{ik} \cdot e_{lj} = \begin{cases} a_{ij}^{(k)} e_{ij} & \text{if } k = l \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

により定める。このとき A は basic, associative, n^2 次元 F -多元環になる。この A を構造系 $\mathbb{A}$ を持つ全行列多元環 または $\mathbb{A}$ -full matrix algebra という。

命題 1.1. (1) $1 = e_1 + \dots + e_n$ は直交原始ベキ等元の和、ただし $e_i := e_{ii}$ ($1 \leq i \leq n$)

(2) A の Jacobson 根基は $J(A) := \bigoplus_{i \neq j} F e_{ij}$ で $J(A)^n = 0$

(3) A の Gabriel quiver $\mathcal{Q}(A) = (\mathcal{Q}_0, \mathcal{Q}_1)$ は連結で loop を持たず、任意の点から点への矢は高々1本である。ここで $\mathcal{Q}_0 = \{1, \dots, n\}$ は点の集合で $\mathcal{Q}_1$ は次のように定まる矢の集合である。

$$j \rightarrow i \in \mathcal{Q}_1 \Leftrightarrow e_i(J(A)/J(A)^2)e_j \neq 0 \Leftrightarrow i \neq j, a_{ij}^{(k)} = 0 \text{ for } \forall k \neq i, j$$

(4) $e_1 A, \dots, e_n A$ は非同型直既約 projectives, $D(Ae_1), \dots, D(Ae_n)$ は非同型直既約 injectives である。ただし $D(\) := \text{Hom}_F(\ , F)$ とする。

典型的な例

以下、 R は離散付値環、 $\pi = \pi R$ は R の極大イデアル、 K は R の商体、 $F := R/\pi R$ は剰余体とする。 n^2 個の非負整数の組 $\{\lambda_{ij} \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ が、 $1 \leq \forall i, j, k \leq n$ に対して

$$\lambda_{ii} = 0, \quad \lambda_{ik} + \lambda_{kj} \geq \lambda_{ij}, \quad \lambda_{ij} + \lambda_{ji} > 0 \text{ if } i \neq j$$

を満たすとき $\mathbb{M}_n(K)$ の R -整環 $\Lambda = (\pi^{\lambda_{ij}} R)$ が作れる。このような Λ を tiled R -order という。

例 1.2. $\mathbb{M}_n(K)$ 内の tiled R -order $\Lambda = (\pi^{\lambda_{ij}} R)$ に対して, $A := \Lambda/\pi\Lambda = \bigoplus_{1 \leq i, j \leq n} F u_{ij}$ は

$$\{u_{ij} := \pi^{\lambda_{ij}} e_{ij} + \pi\Lambda \in A \mid 1 \leq i, j \leq n\}$$

を基底に持つ F -ベクトル空間となる。構造系 $\mathbb{A} = (A_1, \dots, A_n)$, $A_k = (a_{ij}^{(k)}) \in \mathbb{M}_n(F)$ を

$$a_{ij}^{(k)} := \begin{cases} 1 & \text{if } \lambda_{ik} + \lambda_{kj} = \lambda_{ij} \\ 0 & \text{if } \lambda_{ik} + \lambda_{kj} > \lambda_{ij} \end{cases}$$

と定めると, 剰余多元環 A の積は

$$u_{ik} \cdot u_{lj} := \begin{cases} a_{ij}^{(k)} u_{ij} & \text{if } k = l \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

で定まり, A は $\mathbb{A}$ -full matrix algebra である。

例 1.3. $\mathbb{M}_4(K)$ 内の tiled R -order

$$\Lambda = \begin{pmatrix} R & R & R & R \\ \pi & R & \pi & R \\ \pi & \pi & R & R \\ \pi & \pi & \pi & R \end{pmatrix}$$

に対して, $\mathbb{A}$ -full matrix algebra $A = \Lambda/\pi\Lambda$ の構造系 $\mathbb{A}$ は

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

で与えられ, A の Gabriel quiver は次のようになっている。

研究の経緯 $\mathbb{A}$ -full matrix algebra 研究の経緯を 3 つ述べる。

(その 1) 与えられた環 Q 上の $n \times n$ 行列全体のなす加法群 $\mathbb{M}_n(Q)$ に新しく積を定義して環を構成することは, 古くから行われていた (例えば Kupisch [25, 26], Oshiro [27] を参照)。局所 QF 環 Q , $\sigma \in \text{Aut}(Q)$, $c \in J(Q)$ が $\sigma(c) = c$, $\sigma(q)c = cq$ for $\forall q \in Q$ 満たすとき $A = \mathbb{M}_n(Q)$ にある積を定めて QF-環になる歪行列環が構成できる (Baba-Oshiro [4], Theorem 6.1.4)。この (Q, σ, c) を $(F, \text{id}, 0)$ に特殊化すると, A は hereditary R -order

$$\Lambda = \begin{pmatrix} R & R & \cdots & R \\ \pi & R & \cdots & R \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \pi & \cdots & \pi & R \end{pmatrix}$$

に対する例 1.2 の $\mathbb{A}$ -full matrix algebra $\Lambda/\pi\Lambda$ と同型。一方, $\mathbb{A}$ -full matrix algebra $\Lambda/\pi\Lambda$ が Frobenius 多元環となる tiled R -order Λ は hereditary R -order に限らず豊富にある (例えば

Kirichenko [23], Roggenkamp-Kirichenko-Khibina-Zhuravlev [31] を参照)。 $\mathbb{A}$ -full matrix algebra の構造系 $\mathbb{A}$ はこの種の Frobenius 多元環の記述法を与える。

(その2) R -order Λ のホモロジー代数的性質は $\Lambda/\pi\Lambda$ に帰着。例えば Λ -lattice L に対して

$$\mathrm{pd}_\Lambda L = \mathrm{pd}_{\Lambda/\pi\Lambda} L/\pi L, \quad \mathrm{id}_\Lambda = \mathrm{id}_{\Lambda/\pi\Lambda} L/\pi L + 1$$

が成り立つ。特に, tiled R -orders は整環において有限次元多元環の path algebras に対応するものという認識から, ホモロジー代数的性質や表現型 (poset の表現の応用) が研究され難問も残っている ([6], [37], [38], [21], [22], [29], [30], [40], [32], [5], [24], [7], [33], [20], [8], [41], [42], [35], [18] を参照)。この研究において $\Lambda/\pi\Lambda$ の重要性はよく認識されているが理解は限定されている。(その3) $\mathbb{A}$ -full matrix algebras は monomial algebra でない有限次元多元環のまとまった例を提供する。ホモロジー代数予想は monomial algebras に対しては解決している (例えば [15], [43], [44] を参照)。Tiled R -orders Λ の剰余多元環 $\Lambda/\pi\Lambda$ はもっと調べられてもよいと Goodearl and Huisgen-Zimmermann [14] 等でも述べられている。 $\mathbb{A}$ -full matrix algebras はこの種の多元環の枠組みを与える。

2. 小さい n の場合

$n = 2$ のときは, 明らかに構造系は $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ のみである。

$n = 3$ のときは, 同型を除いて5個となるが, これを示すために次の定義を準備する。

定義: 任意の構造系 $\mathbb{A} = (a_{ij}^{(k)})$ に対して $\bar{\mathbb{A}} = (\bar{a}_{ij}^{(k)})$ を

$$\bar{a}_{ij}^{(k)} := \begin{cases} 1 & \text{if } a_{ij}^{(k)} \neq 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

により定めると $\bar{\mathbb{A}}$ も構造系になる。これを $\mathbb{A}$ の $(0,1)$ -limit という。

定理 2.1([12]). $n = 3$ のとき, 任意の $\mathbb{A}$ -full matrix algebra はその $(0,1)$ -limit に同型で, 次の5個の $(0,1)$ -構造系が同型類の完全代表系を定める。

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$n = 4$ のときは, 非同型 $(0,1)$ -構造系は 289 個だが, F が無限体ならば同型類は無数個ある。

定理 2.2([12]). $n \geq 4$ のときは F の元をパラメーターとする非同型な系列がある。特に F が無限体ならば, 同じ $(0,1)$ -limit を持つ非同型な無限系列がある。

例 2.3. $0 \neq a \in F$ に対して

$$\mathbb{A}(a) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & a & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

と定める。 $\mathbb{A}(a)$ -full matrix algebra $A(a)$ と $\mathbb{A}(b)$ -full matrix algebra $A(b)$ に対して $A(a) \cong A(b)$ as F -algebras $\Leftrightarrow a = b$ or $a = b^{-1}$

命題 2.4. (同型判定法) $A, B : n \times n$ full matrix algebras with $\mathbb{A}, \mathbb{B} : \text{構造系とする}$.
 $A \cong B$ as F -algebras $\Leftrightarrow \exists \sigma \in S_n, \exists T = (t_{ij}) \in \mathbb{M}_n(F)$ s.t. $t_{ij} \neq 0, t_{ii} = 1$

$$a_{\sigma(i), \sigma(j)}^{(\sigma(k))} t_{ij} = b_{ij}^{(k)} t_{ikt_{kj}}$$

3. FROBENIUS ALGEBRAS

この節では, Frobenius $\mathbb{A}$ -full matrix algebras を考察し, tiled R -orders との対応関係について述べる。Frobenius algebras の定義の復習から始める。

定義: 有限次元 F -algebra B が Frobenius

$$\begin{aligned} &:\Leftrightarrow \exists \psi : B \rightarrow F : F\text{-linear map s.t. Ker } \psi \not\supset \text{non-zero right (or left) ideal} \\ &(\Leftrightarrow B \cong \text{Hom}_F(B, F) \text{ as right } B\text{-modules}) \end{aligned}$$

(注) B が basic のときは, $B : \text{Frobenius} \Leftrightarrow B_B : \text{injective} \Leftrightarrow {}_B B : \text{injective}$

$$\Leftrightarrow \text{for } \forall i, \text{soc}(e_i B) : \text{simple, } \text{soc}(e_i B) \not\cong \text{soc}(e_j B) \text{ if } i \neq j$$

このとき, $\exists \sigma \in S_n$ s.t. $\text{soc}(e_i B) \cong \text{top}(e_{\sigma(i)} B)$ (この σ を Nakayama 置換という)

$\mathbb{A}$ -full matrix algebra 上の加群

$A = \bigoplus_{1 \leq i, j \leq n} F e_{ij}$ を $\mathbb{A}$ -full matrix algebra とする。有限生成右 A -加群 M_A に対して, M の dimension type $\underline{\dim} M := (d_1, \dots, d_n) \in \mathbb{Z}^n$ を $d_i := \dim_F M e_i$ ($1 \leq i \leq n$) により定める。

命題 3.1. $\mathbb{A}$ -full matrix algebra A の Cartan 行列 C の各 (i, j) -成分は $\dim_F e_i A e_j = 1$ で, $\det C = 0$ となり $\text{gl.dim } A = \infty$ が常に成り立つ。

M_A は右 A -加群で $\underline{\dim} M = (1, \dots, 1)$ となるものとする。このとき M の F -基底 $\{v_1, \dots, v_n\}$ で $v_i e_i = v_i$ となるものが取れて, $v_i e_{ij} = s_{ij} v_j$ ($s_{ij} \in F$) と表せる。このとき $S = (s_{ij}) \in \mathbb{M}_n(F)$ を M の表現行列という。

命題 3.2. (1) $\underline{\dim} e_i A = (1, \dots, 1)$ で, $e_i A$ の表現行列は $(a_{ij}^{(k)})_{k,j} \in \mathbb{M}_n(F)$

(2) $\underline{\dim} D(A e_j) = (1, \dots, 1)$ で, $D(A e_j)$ の表現行列は $(a_{ij}^{(k)})_{i,k} \in \mathbb{M}_n(F)$

(3) $\underline{\dim} M_A = (1, \dots, 1)$ with $S = (s_{ij}) : \text{表現行列}$ のとき

(a) $M_A \cong e_i A \Leftrightarrow s_{ij} \neq 0$ for $\forall j = 1, 2, \dots, n$

(b) $M_A \cong D(A e_j) \Leftrightarrow s_{ij} \neq 0$ for $\forall i = 1, 2, \dots, n$

例 3.3. 例 1.3 の tiled R -order から作った構造系

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

から e_1A, e_2A, e_3A, e_4A の表現行列を作ると次が分かる。

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$e_1A \cong D(Ae_4) \quad e_2A \cong D(Ae_3) \quad e_3A \cong D(Ae_2) \quad e_4A : \text{non-injective}$

定理 3.4([9, 10, 11, 12]). $A = \bigoplus_{1 \leq i, j \leq n} Fe_{ij} : \mathbb{A}$ -full matrix algebra に対して次が成り立つ。

- (1) $A : \text{Frobenius} \Leftrightarrow \exists \sigma \in S_n$ s.t. $\sigma(i) \neq i$ for $\forall i, a_{i, \sigma(i)}^{(k)} \neq 0$ for $1 \leq \forall i, k \leq n$
- (2) $A : \text{Frobenius} \Leftrightarrow (0, 1)$ -limit $\bar{A} : \text{Frobenius}$
- (3) $\mathbb{A} = (a_{ij}^{(k)}) : \text{Frobenius } (0, 1)$ -構造系 $\Rightarrow a_{ij}^{(k)} = a_{k, \sigma(i)}^{(j)}$ for $1 \leq \forall i, j, k \leq n$
- (4) $A : \text{Frobenius}, \sigma : \text{Nakayama 置換}$ のとき, F -linear map $\psi : A \rightarrow F$ は次で与えられる:

$$\psi(e_{ij}) = \begin{cases} 1 & \text{if } j = \sigma(i) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Frobenius (0, 1)-構造系の見つけ方

定理 3.4 (3) を用いて Frobenius (0, 1)-構造系を見つけてみよう。最初に, $\sigma \in S_n$ s.t. $\sigma(i) \neq i$ for $\forall i$ を与えておく。 $T := \{(i, k, j) \in \mathbb{Z}^3 \mid 1 \leq i, j, k \leq n\}$ とおき, T の置換

$$\varphi : T \rightarrow T, (i, k, j) \mapsto (k, j, \sigma(i))$$

を定める。 φ で T を $T = \bigsqcup_{\alpha} T_{\alpha}$ と φ -orbits 分解する。構造系の条件 (A2), (A3) を考慮して, φ -orbits を 3 種類に分ける。

$$\begin{aligned} I &= \cup \{T_{\alpha} \mid (i, i, j) \in T_{\alpha} \text{ for some } 1 \leq i, j \leq n\} \\ Z &= \cup \{T_{\alpha} \mid (i, k, i) \in T_{\alpha} \text{ for some } 1 \leq i, k \leq n \text{ with } i \neq k\} \\ X &= \cup \{T_{\alpha} \mid T_{\alpha} \not\subset I, T_{\alpha} \not\subset Z\} \end{aligned}$$

そして $\mathbb{A} = (a_{ij}^{(k)})$ を

$$a_{ij}^{(k)} := \begin{cases} 1 & \text{if } (i, k, j) \in I \\ 0 & \text{if } (i, k, j) \in Z \\ a_{\alpha} & \text{if } (i, k, j) \in T_{\alpha} \subset X \quad (a_{\alpha} = 0 \text{ or } 1) \end{cases}$$

のように定める。構造系の条件 (A1) が成り立てば $\mathbb{A}$ は Frobenius (0, 1)-構造系になる。

定理 3.5([10]). (1) $a_{\alpha} = 0$ for $\forall T_{\alpha} \subset X$ のとき $\mathbb{A} = (a_{ij}^{(k)})$ は Frobenius (0, 1)-構造系になる。

(2) 特に $\sigma = (1, 2, \dots, n)$ と仮定する。 $T_{\alpha} \subset X$ を 1 つ固定して, $a_{\alpha} = 1$, その他の $a_{\beta} = 0$ として $\mathbb{A} = (a_{ij}^{(k)})$ を定める。このとき

(a) n が偶数のときは, 常に $\mathbb{A}$ は Frobenius (0, 1)-構造系である。

- (b) $n = 2s + 1$ が奇数のときは, $(s + 1, 1, k) \in T_\alpha$ ならば $k \equiv s^2 + 1 \pmod{n}$ の場合のみ $\mathbb{A}$ は Frobenius $(0, 1)$ -構造系である。

定理 3.5 (2) のように 1 つの φ -orbit $T_\alpha \subset X$ で定まる構造系を極小構造系という。

Tiled R -orders との対応

任意の tiled R -order Λ に対して $A = \Lambda/\pi\Lambda$ はある $(0, 1)$ -構造系 $\mathbb{A}$ による $\mathbb{A}$ -full matrix algebra である (例 1.2)。それでは逆に

逆の問題： 任意の $(0, 1)$ -構造系は対応する tiled R -order を持つか？

例 3.6. $n = 4$ のとき, 次の $(0, 1)$ -構造系に対応する tiled R -order は存在しない。

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(注) $n = 4$ のとき, 非同型な $(0, 1)$ -構造系は 289 個あるが, そのうち対応する tiled R -order を持たないものは 16 個ある。 $n = 2, 3$ のときは, 逆問題は成り立つ。

定義： Λ : Gorenstein R -order $:\Leftrightarrow \text{Hom}_R(\Lambda, R)$ は右 (または左) Λ -加群として projective

Gorenstein tiled R -orders は hereditary R -orders を含み, より多様性のある研究対象である (例えば Roggenkamp, Kirichenko 等の [31] や [18] の 7 章を参照)。次の命題は直ぐ分かる。

命題 3.7. Λ : Gorenstein tiled R -order $\Rightarrow \Lambda/\pi\Lambda$: Frobenius $\mathbb{A}$ -full matrix algebra

この命題 3.7 の逆問題は, 次の定理により解決。

定理 3.8([10]) (1) $2 \leq n \leq 7$ の場合: 任意の Frobenius $\mathbb{A}$ -full matrix algebras は対応する Gorenstein tiled R -order を持つ。

(2) $n \geq 8$ の場合: 対応する Gorenstein tiled R -order を持たない Frobenius $\mathbb{A}$ -full matrix algebra が存在する。

(注) (1) は $2 \leq n \leq 7$ の Frobenius $\mathbb{A}$ -full matrix algebras を全て求めて検証。(2) の Frobenius $\mathbb{A}$ -full matrix algebra は極小構造系を持つものの中で見つけた。

4. TILED ORDERS OF FINITE GLOBAL DIMENSION

Dedekind 整域 R の商体 K 上有限次元分離多元環の中の極大 R -整環 Λ は, 可換 Dedekind 整域の非可換版とみなせる。gl.dim $\Lambda = 1$ で可換の場合と同様の乗法的イデアル論が成り立つ。可換の場合は gl.dim = 1 の整域が Dedekind 整域を特徴付けるのに対し, 非可換の場合は極大 R -整環以外にも gl.dim = 1 の hereditary R -整環が存在して, 非可換固有の乗法的イデアル論など興味深い現象が知られている (例えば [19], [3], [16], [28] を参照)。

この研究に続いて「離散付値環上の整環で gl.dim 有限なものほどのくらいあるか？」が問題になった。Fields [6] は、任意の n に対し $\text{gl.dim} \Lambda = n$ の tiled R -order Λ を見つけた。そして Tarsy [37], [38] と Jategaonkar [21], [22] により次の 2 定理が得られた。

定理 4.1(Tarsy 1971, Jategaonkar 1973).

$\Lambda = (\pi^{\lambda_{ij}} R) : \text{tiled } R\text{-order in } \mathbb{M}_n(K)$ s.t. $\lambda_{ij} = 0$ if $i \leq j$ に対して、次は同値。

(1) $\text{gl.dim} \Lambda < \infty$ (2) $\text{gl.dim} \Lambda \leq n - 1$ (3) $\Lambda \supset \Omega_n$ ただし

$$\Omega_n := \begin{pmatrix} R & R & R & \cdots & R \\ \pi R & R & R & \cdots & R \\ \pi^2 R & \pi R & R & \cdots & R \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \pi^{n-1} R & \pi^{n-2} R & \pi^{n-3} R & \cdots & R \end{pmatrix}$$

定理 4.2(Jategaonkar 1974).

$\Lambda = (\pi^{\lambda_{ij}} R) : \text{tiled } R\text{-order in } \mathbb{M}_n(K)$, $\text{gl.dim} \Lambda < \infty \Rightarrow \lambda_{ij} \leq n - 1$ for $1 \leq \forall i, j \leq n$
従って、 gl.dim 有限の tiled R -orders は n を固定すると同型を除いて有限個。

(注) 証明の鍵は $\Lambda/\pi\Lambda$ の任意の直既約 projectives の F -次元 $= n$ という事実。

この 2 定理により、 gl.dim 有限の tiled R -orders の決定が期待され、次の予想も起きた。

Tarsy 予想 : $\Lambda : R\text{-order in } \mathbb{M}_n(K)$, $\text{gl.dim} \Lambda < \infty \Rightarrow \text{gl.dim} \Lambda \leq n - 1 ?$

大きい gl.dim を持つ tiled R -orders

Tarsy 予想は [7] で、任意の $n \geq 6$ に対して $\text{gl.dim} \Lambda = n$ となる $\mathbb{M}_n(K)$ 内の tiled R -order Λ が見つかかり解決した。しかし、 n を固定したとき n が gl.dim 有限の最大値になるとは思えなかった。その後、Rump [33] により $n = 8$ のとき $\text{gl.dim} = 9$ の例が見つかった。更に、Jansen-Odenthal [20] は、任意の偶数 $N \geq 8$ に対して $\text{gl.dim} = 2N - 8$ となる例を見つけた。この gl.dim の計算は、 $8 \leq N \leq 24$ は計算機による個別計算で検証し、帰納法は $N \geq 26$ から有効になるものであった。この様にいくつか例は見つかっているが、次の問題は未解決である。

Open Problem: $\text{Max}\{\text{gl.dim} \Lambda \mid \Lambda : \text{tiled } R\text{-order in } \mathbb{M}_n(K), \text{gl.dim} \Lambda < \infty\} = ?$

これまでに見つかった大きい gl.dim を持つ tiled R -orders は、quasi-hereditary algebra と関連のある neat primitive idempotent で捉えると見通しが良くなることが [8] で明らかになった。

定義 (Ágoston-Dlab-Wakamatsu [1]) :

S : semiperfect Noetherian ring with Jacobson radical J , $e_n \in S$: primitive idempotent, $e := 1 - e_n$, V_S : simple with $V e_n \neq 0$ とする。このとき

e_n : neat : $\Leftrightarrow \text{Ext}_S^i(V, V) = 0$ for $\forall i \geq 1$

$\Leftrightarrow e_n J$ の極小射影分解に $e_n S$ が現れない

$\Leftrightarrow Se \otimes_{eSe} eS \cong SeS$, $e_n J e_n = e_n S e S e_n$, $\text{Tor}_i^{eSe}(Se, eS) = 0$ for $\forall i \geq 1$

(注) 最後の同値条件から neat primitive idempotent の左右対称性が分かる。

Jansen-Odenthal の例は, neat primitive idempotent に注目して次のように改良できる。

例 4.3([8]). 任意の $n \geq 6$ に対して $\mathbb{M}_n(K)$ 内の tiled R -order Λ_n で $\text{gl.dim } \Lambda_6 = \text{gl.dim } \Lambda_7 = 5$, $\text{gl.dim } \Lambda_n = 2n - 8$ ($n \geq 8$) となるものを, neat primitive idempotent を添加することにより帰納的に構成できる。(計算機による検証は不要)

例 4.4([8]). $n = 8$ のとき $\text{gl.dim } \Lambda = 10$ となる tiled R -order Λ in $\mathbb{M}_8(K)$ がある。これから出発して neat primitive idempotents を添加して行くと, gl.dim が例 4.3 を越えるものが作れる。

以上の様な例の考察から gl.dim 有限な tiled R -orders 決定に向け次の問題が起こった。

Questions: (1) $\text{gl.dim } \Lambda < \infty \Rightarrow \exists e_n \in \Lambda : \text{neat primitive idempotent} ?$

(注) これは Jategaonkar 予想 [22] の改良版。より一般に,

(2) n に関して帰納的に gl.dim 有限の tiled orders を捉えられないか?

即ち, $\Lambda : \text{tiled } R\text{-order in } \mathbb{M}_n(K)$, $\text{gl.dim } \Lambda < \infty$ ならば $\Lambda \cong \begin{pmatrix} \Lambda_1 & A \\ B & R \end{pmatrix}$ となる tiled R -order $\Lambda_1 \subset \mathbb{M}_{n-1}(K)$ with $\text{gl.dim } \Lambda_1 < \infty$ があるか?

$\mathbb{A}$ -full matrix algebras は, この Questions を肯定的に解決しようとした試みの中で考案した。この Questions には最近 [13] で反例が見つかったが, $\mathbb{A}$ -full matrix algebra の議論が役立つ所が 1 箇所あり, 全く無駄ではなかった。以下, この反例の解説をする。

剰余体 $F = R/\pi R$ の標数と $\text{gl.dim } \Lambda$

Tiled R -orders $\Lambda = (\pi^{\lambda_{ij}} R)$ の $\text{gl.dim } \Lambda$ は指数行列 (λ_{ij}) のみで決まるだろうか?

先に述べた大きい gl.dim を持つ tiled R -orders など知られている殆どの例では, gl.dim は指数行列のみで決まる。しかし Rump [33] は次の定理を示している。

定理 4.5(Rump 1996).

(1) $\Lambda = (\pi^{\lambda_{ij}} R)$ の gl.dim は指数行列 (λ_{ij}) と剰余体 $F = R/\pi R$ の標数のみで決まる。

(2) gl.dim が 2 以下のときは剰余体の標数に依存しない。

(注) gl.dim が F の標数に依存しない tiled R -order を **regular** という。語源は Matroid Theory で, (2) の証明に graph の matroid に関する簡単な事実 (例えば Tutte [39] を参照) が使われていることに由来する。 gl.dim が 3 以上になると regular でない tiled R -order が現れる。

例 4.6(Rump, 1996). $\exists \Lambda : \text{tiled } R\text{-order in } \mathbb{M}_{14}(K)$ s.t.

$$\text{gl.dim } \Lambda = \begin{cases} 3 & \text{if } \text{char} F \neq 2 \\ 4 & \text{if } \text{char} F = 2 \end{cases}$$

(注) この例の原型は Spears [36] にある。Non-regular tiled R -orders はサイズが大きくなり, 知られている例は限られている。標数に依存して gl.dim が有限無限の例は知られていなかった。

Questions の反例 ([13]) p : 素数, $n = 4p + 5$ のとき $\exists \Lambda$: tiled R -order in $\mathbb{M}_n(K)$ s.t.

$$\text{gl.dim } \Lambda = \text{id } \Lambda = \begin{cases} 5 & \text{if } \text{char} F \neq p \\ \infty & \text{if } \text{char} F = p \end{cases}$$

- (1) Λ は neat primitive idempotent を持たない。(注 : 極小射影分解の形が必要になる)
- (2) Λ のどの primitive idempotent を削除しても $\text{gl.dim} = \infty$ の tiled R -order になる。
即ち , gl.dim 有限の tiled R -orders は n に関して帰納的に連なって現れることはない。

反例の具体的な形 p : a prime, $l := p + 1$, $\mathcal{P} = (\mathcal{P}_0, \mathcal{P}_1)$: a quiver defined by

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_0 &:= \{a_i, b_i, c_i, d_i \mid 1 \leq i \leq l\} \cup \{d\} \\ \mathcal{P}_1 &:= \left\{ \begin{array}{ll} b_i \rightarrow a_i, & b_i \rightarrow a_{i+1} \\ c_i \rightarrow a_i, & c_i \rightarrow a_{i+1} \\ d_i \rightarrow c_i, & d_i \rightarrow b_{i+k} \\ d \rightarrow c_i \end{array} \right\} \quad (1 \leq i \leq l, 1 \leq k \leq p) \end{aligned}$$

ただし a_i, b_i の添数 i は mod l で考える。 $n = |\mathcal{P}_0| = 4p + 5$, $|\mathcal{P}_1| = p^2 + 7p + 6$ に注意。
この finite quiver $\mathcal{P}$ から対応する tiled R -order Λ を作る。

$p = 2$ のときは $n = 13$ で quiver $\mathcal{P}$ および対応する tiled R -order Λ は次のようになる。

$$\Lambda = \begin{pmatrix} R & \pi \\ \pi & R & \pi \\ \pi & \pi & R & \pi \\ R & R & \pi & R & \pi \\ R & R & \pi & \pi & R & \pi \\ \pi & R & R & \pi & \pi & R & \pi \\ \pi & R & R & \pi & \pi & \pi & R & \pi & \pi & \pi & \pi & \pi & \pi \\ R & \pi & R & \pi & \pi & \pi & \pi & R & \pi & \pi & \pi & \pi & \pi \\ R & R & R & R & \pi & R & \pi & \pi & R & R & \pi & \pi & \pi \\ R & R & R & \pi & R & R & \pi & R & \pi & \pi & R & \pi & \pi \\ R & R & R & R & \pi & \pi & R & R & \pi & \pi & \pi & R & \pi \\ R & R & R & \pi & R & \pi & R & \pi & R & \pi & \pi & \pi & R \end{pmatrix}$$

ただし Λ は vertices を $a_1, a_2, a_3, b_1, c_1, b_3, c_3, b_2, c_2, d_3, d_1, d_2, d$ の順に並べて作ってある。

Poset の表現圏を用いた極小射影分解の計算方法

一般にサイズが大きくなると tiled R -orders の極小射影分解は、前述の Jansen-Odenthal の gl.dim の計算からも推察できるように、複雑で計算不能になる。我々の反例では Rump [33] の poset の表現圏における射影分解に帰着する方法を微修正して、極小射影分解を計算する。

Poset の表現圏は Zavadskij-Kirichenko [41], [42], Roggenkamp-Wiedemann [32] により tiled R -orders の表現型の研究に導入され、後に de la Peña-Raggi-Cárdenas [5], Rump [33] により射影次元の計算にも使われるようになった。Poset の表現圏の復習から始める。([35], [2], [18] 参照)

定義 : $(\Omega, \leq)$: poset, F : 体, $\text{Vec}_F(\Omega)$: 次の objects と morphisms で定まる圏

objects $Y = (Y, \{Y(a)\}_{a \in \Omega})$, where Y : 有限次元 F -vector space,

$$\{Y(a)\}_{a \in \Omega} : Y \text{ の部分空間族 s.t. } a \leq b \Rightarrow Y(a) \supset Y(b)$$

morphisms $f : Y \rightarrow Y' : F$ -linear map s.t. $f(Y(a)) \subset Y'(a)$ for $\forall a \in \Omega$

(注) $\text{Vec}_F(\Omega)$ は additive category with kernels and cokernels **だが**, coimage $\subsetneq$ image で abelian category にはならない。

- $f : Y \rightarrow Y'$ が **strict** $:\Leftrightarrow f(Y(a)) = f(Y) \cap Y'(a)$ for $\forall a \in \Omega$
- $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$: **exact** in $\text{Vec}_F(\Omega) :\Leftrightarrow f(X) = \text{Ker } g, f(X(a)) = \text{Ker } g \cap Y(a)$ for $\forall a \in \Omega$
- $D = \text{Hom}_F(_, F) : \text{Vec}_F(\Omega) \rightarrow \text{Vec}_F(\Omega^{\text{op}})$ は duality を定める。ただし $Y \in \text{Vec}_F(\Omega)$ に対して $D(Y)(a) := \{\alpha \in D(Y) \mid \alpha(Y(a)) = 0\}$ ($a \in \Omega$) とする。

補題 4.7. (1) $f : \text{strict} \Rightarrow D(f) : \text{strict}$ が成り立つ。

(2) (**Snake Lemma** for $\text{Vec}_F(\Omega)$)

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \longrightarrow & 0 \\ \alpha \downarrow & & \beta \downarrow & & \gamma \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & X' & \xrightarrow{f'} & Y' & \xrightarrow{g'} & Z' \end{array}$$

rows exact, α, β, γ : strict ならば、次は $\text{Vec}_F(\Omega)$ で exact

$$\text{Ker } \alpha \rightarrow \text{Ker } \beta \rightarrow \text{Ker } \gamma \xrightarrow{\delta} \text{Coker } \alpha \rightarrow \text{Coker } \beta \rightarrow \text{Coker } \gamma$$

- $P \in \text{Vec}_F(\Omega)$: **projective** $:\Leftrightarrow \forall X \xrightarrow{f} Y \rightarrow 0$: exact, $\forall g : P \rightarrow Y$;
 $\exists h : P \rightarrow X$ s.t. $g = f \circ h$
- $a \in \Omega$ に対して 1 次元 $P_a \in \text{Vec}_F(\Omega)$ を $P_a := Fa$: F -vector space with a basis $\{a\}$

$$P_a(b) := \begin{cases} Fa & \text{if } b \leq a \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (b \in \Omega)$$

と定める。このとき P_a は projective in $\text{Vec}_F(\Omega)$ である。

- $\text{Vec}_F(\Omega)$ の **injectives** は duality D を用いて $\text{Vec}_F(\Omega^{\text{op}})$ の projectives の dual と定める。

以下、poset $(\Omega, \leq)$ は、与えられた tiled R -order $\Lambda = (\pi^{\lambda_{ij}} R)$ in $\text{M}_n(K)$ に対して

$$\Omega := \mathbb{Z} \times \{1, \dots, n\}, \quad (k, i), (l, j) \in \Omega \text{ に対して } (k, i) \leq (l, j) :\Leftrightarrow \lambda_{ij} \leq l - k$$

と定め、 Ω の順序を保つ全単射 $\sigma : \Omega \rightarrow \Omega, (k, i) \mapsto (k + 1, i)$ も組み込んだ σ -poset を扱う。

$Y \in \text{Vec}_F(\Omega)$ が $Y(a) = Y, Y(b) = 0$ for some $a, b \in \Omega$ を満たすとき, Y は **bounded** という. $\text{Vec}_F^0(\Omega)$ で bounded な Y からなる $\text{Vec}_F(\Omega)$ の full subcategory を表す.

命題 4.8. $Y \in \text{Vec}_F^0(\Omega)$ とする. 各 $a \in \Omega$ に対して $Y_0(a) := \sum_{x>a} Y(x)$ と定める.

(1) $C := \{a \in \Omega \mid Y_0(a) \subsetneq Y(a)\}$ は有限集合

(2) $c \in C$ に対して $d(c) := \dim_F Y(c)/Y_0(c)$, $Y(c) = Y_0(c) \oplus \bigoplus_{i=1}^{d(c)} Fv_i$ as F -vector spaces として $\varepsilon_c : P_c^{d(c)} \rightarrow Y$, $\alpha_c = (\alpha_i c)_i \mapsto \sum_i \alpha_i v_i$ を定める. このとき F -linear map

$$\varepsilon : \bigoplus_{c \in C} P_c^{d(c)} \rightarrow Y, (\alpha_c)_c \mapsto \sum_{c \in C} \varepsilon_c(\alpha_c)$$

は strict epimorphism in $\text{Vec}_F(\Omega)$ になる. 更に, 任意の strict epimorphism $f : Q \rightarrow Y$ with projective $Q \in \text{Vec}_F^0(\Omega)$ に対して, $f = \varepsilon \circ g$ となる strict epimorphism $g : Q \rightarrow P$ が存在する.

定義: 命題 4.8 の $\varepsilon : \bigoplus_{c \in C} P_c^{d(c)} \rightarrow Y$ を $Y \in \text{Vec}_F^0(\Omega)$ の **projective cover** という.

Λ -Lat を左 Λ -lattices の圏とする. σ -poset の表現圏は, 離散付値環 R が特に形式的ベキ級数環 $F[[t]]$ のとき, 次の関手により有効となる. 即ち, $F[[t]] \subset \prod_{k \in \mathbb{Z}} Ft^k$ とみなして

$$L : \text{Vec}_F^0(\Omega) \rightarrow \Lambda\text{-Lat}, \quad Y \mapsto L(Y) := \begin{pmatrix} \prod_{k \in \mathbb{Z}} Y(-k, 1)t^k \\ \vdots \\ \prod_{k \in \mathbb{Z}} Y(-k, n)t^k \end{pmatrix}$$

と定めると, $\text{Vec}_F^0(\Omega)$ での projective covers による 極小射影分解が関手 L で Λ -Lat の極小射影分解に移る. 例えば, 1次元表現 $P_{(k,i)} \in \text{Vec}_F^0(\Omega)$ に対して $L(P_{(k,i)}) \cong \Lambda e_i$ となる. よって Λ -Lat での極小射影分解の計算は, $\text{Vec}_F^0(\Omega)$ での線形代数に帰着される.

一般の離散付値環 R の場合は, 剰余体 $F = R/\pi R$ 上の形式的ベキ級数環 $R' = F[[t]]$ で tiled R' -order $\Lambda' = (t^{\lambda_{ij}} R')$ を作る. Λ -Lat と Λ' -Lat の極小射影分解は $\mathbb{A}$ -full matrix algebras $\Lambda/\pi\Lambda \cong \Lambda'/t\Lambda'$ を介して, 形が同じになることが分かり $R = F[[t]]$ の場合に帰着する.

(注) 酒井洋介 [34] では σ -poset の表現圏を使わずに, 加群の初等的な完全列を新たに作って, その応用として Λ -Lat の中で直接 Jacobson 根基の極小射影分解を計算している.

REFERENCES

- [1] I. Ágoston, V. Dlab and T. Wakamatsu, *Neat algebras*, Comm. Algebra 19 (1991), 433-442.
- [2] D.M. Arnold, *Abelian groups and representations of finite partially ordered sets*, CMS Books in Mathematics, Springer, 2000.
- [3] M. Auslander and O. Goldman, *Maximal orders*, Trans. Amer. Math. Soc. 97 (1960), 1-24.
- [4] Y. Baba, K. Oshiro, *Classical Artinian rings and related topics*, 2007.
- [5] J. A. de la Peña, A. Raggi-Cárdenas, *On the global dimension of algebras over regular local rings*, Illinois J. Math. 32 (3) (1988), 520-533.
- [6] K. L. Fields, *Examples of orders over discrete valuation rings*, Math. Z. 111 (1969), 126-130.
- [7] H. Fujita, *Tiled orders of finite global dimension*, Trans. Amer. Math. Soc. 322 (1990), 329-341; Erratum: Trans. Amer. Math. Soc. 327 (1991), 919-920.
- [8] H. Fujita, *Neat idempotents and tiled orders having large global dimension*, J. Algebra 256 (2002), 194-210.
- [9] H. Fujita, *Full matrix algebras with structure systems*, Colloq. Math. 98 (2003), 249-258.
- [10] H. Fujita, Y. Sakai, *Frobenius full matrix algebras and Gorenstein tiled orders*, Comm. Algebra 34, (2006), 1181-1203.
- [11] H. Fujita, Y. Sakai, D. Simson, *On Frobenius full matrix algebras with structure systems*, Algebra and Discrete Math. No. 1 (2007), 24-39.

- [12] H. Fujita, Y. Sakai, D. Simson, *Minor degenerations of the full matrix algebra over a field*, J. Math. Soc. Japan 59 (2007), 763-795.
- [13] H. Fujita, A. Oshima, *A tiled order of finite global dimension with no neat primitive idempotent*, to appear in Comm. Algebra.
- [14] K. R. Goodearl and B. Huisgen-Zimmermann, *Repetitive resolutions over classical orders and finite dimensional algebras*, Algebras and Modules II (Geiranger, 1996), CMS Conf. Proc. 24, Amer. Math. Soc., Providence, RI, (1998), 205-225.
- [15] E.L. Green, E.E. Kirkman, J.J. Kuzmanovich, *Finitistic dimension of finite dimensional monomial algebras*, J. Algebra 136 (1991), 37-51.
- [16] M. Harada, *Hereditary orders*, Trans. Amer. Math. Soc. 107 (1963), 273-290.
- [17] M. Hazewinkel, N. Gubareni, V.V. Kirichenko, *Algebras, Rings and Modules*, vol. 1, Math. and its applications, Kluwer Academic Publishers, 2004.
- [18] M. Hazewinkel, N. Gubareni, V.V. Kirichenko, *Algebras, Rings and Modules*, vol. 2, Math. and its applications, Springer, 2007.
- [19] N. Jacobson, *The Theory of Rings*, Mathematical Surveys Number II, Amer. Math. Soc., 1943.
- [20] W. S. Jansen, C. J. Odenthal, *A tiled order having large global dimension*, J. Algebra 192 (1997), 572-591.
- [21] V. A. Jategaonkar, *Global dimension of triangular orders over a discrete valuation ring*, Proc. Amer. Math. Soc. 38 (1973), 8-14.
- [22] V. A. Jategaonkar, *Global dimension of tiled orders over a discrete valuation ring*, Trans. Amer. Math. Soc. 196 (1974), 313-330.
- [23] V.V. Kirichenko, *On quasi-Frobenius rings and Gorenstein orders*, Trudy Mat. Steklov Inst. 148 (1978), 168-174 (in Russian), English translation in Proc. Steklov Inst. Math. (1980) Issue 4, 171-177.
- [24] E. Kirkman, J. Kuzmanovich, *Global dimension of a class of tiled orders*, J. Algebra 127 (1989), 57-72.
- [25] H. Kupisch, *Über eine Klasse von Ringen mit Minimalbedingung I*, Arch. Math. 17 (1966), 20-35.
- [26] H. Kupisch, *Über eine Klasse von Artin-Ringen II*, Arch. Math. 26 (1975), 23-35.
- [27] K. Oshiro, *Structure of Nakayama rings*, Proc. 20th Symp. Ring Theory, Okayama (1987), 109-133.
- [28] I. Reiner, *Maximal orders*, Academic Press, 1975.
- [29] K.W. Roggenkamp, *Some examples of orders of global dimension two*, Math. Z. 154 (1977), 225-238.
- [30] K. W. Roggenkamp, *Orders of global dimension two*, Math. Z. 160 (1978), 63-67.
- [31] K.W. Roggenkamp, V.V. Kirichenko, M.A. Khibina, V.N. Zhuravlev, *Gorenstein tiled orders*, Comm. Algebra 29 (2001), 4231-4247.
- [32] K. W. Roggenkamp, A. W. Wiedemann, *Auslander-Reiten quivers of Schurian orders*, Comm. Algebra 12 (1984), 2525-2578.
- [33] W. Rump, *Discrete posets, cell complexes, and the global dimension of tiled orders*, Comm. Algebra 24 (1996), 55-107.
- [34] Y. Sakai, *An elementary exact sequence of modules with an application to tiled orders*, Colloq. Math. 113 no. 2 (2008), 307-318.
- [35] D. Simson, *Linear representations of partially ordered sets and vector space categories*, Algebra, Logic and Applications, vol. 4, Gordon & Breach Science Publishers, 1992.
- [36] W.T. Spears, *Global dimension in categories of diagrams*, J. Algebra 22 (1972), 219-222.
- [37] R. B. Tarsy, *Global dimension of orders*, Trans. Amer. Math. Soc. 151 (1970), 335-340.
- [38] R. B. Tarsy, *Global dimension of triangular orders*, Proc. Amer. Math. Soc. 28(2) (1971), 423-426.
- [39] W.T. Tutte, *Introduction to the theory of matroids*, Amer. Elsevier Publ. Comp., Inc. New York, 1971.
- [40] A. Wiedemann, K. W. Roggenkamp, *Path orders of global dimension two*, J. Algebra 80 (1983), 113-133.
- [41] A. G. Zavadskij, V. V. Kirichenko, *Torsion-free modules over primary rings*, Zap. Nauchn. Sem. LOMI im. V.A. Steklova AN SSSR 57 (1976), 100-116 = J. Soviet Math. (1979), 598-612.
- [42] A. G. Zavadskij, V. V. Kirichenko, *Semimaximal rings of finite type*, Mat. Sbornik, 103 (1977), 323-345.
- [43] B. Zimmermann Huisgen, *Homological domino effects and the first finitistic dimension conjecture*, Invent. Math. 108 (1992), 369-383.
- [44] B. Zimmermann Huisgen, *The finitistic dimension conjectures - a tale of 3.5 decades*, in "Abelian Groups and Modules", A. Facchini and C. Menini(eds.), Kluwer Academic Publ. (1995), 501-517.